

Più belle con Eva

a cura del Prof. Marco Gasparotti

COME MIGLIORARE POLPACCI E GLUTEI

La chirurgia estetica di aumento di volume dei polpacci e dei glutei consente di modificare la forma e le dimensioni dei polpacci e dei glutei troppo piccoli migliorando il profilo corporeo e la propria autostima. Cosa si può fare per migliorare la forma ed il volume dei polpacci o dei glutei? Ne parliamo oggi con il nostro esperto, prof. Marco Gasparotti, docente di Chirurgia Estetica in alcune tra le più prestigiose Università italiane, dal suo accogliente studio alla Clinica Ars Medica, a Roma.



Prof Gasparotti, quali sono i rischi e le complicanze di questo tipo di intervento?

La chirurgia di aumento del volume di polpacci e dei glutei è una procedura chirurgica relativamente semplice, che prevede, a seconda dei casi un modellamento con lipofilling o con protesi al silicone, che da ottimi risultati. Occorre però, come sempre, non sottovalutare la natura ed i rischi di un intervento chirurgico, e non cadere nella tentazione di rivolgersi a medici non specialisti che offrono prestazioni a basso costo in strutture non autorizzate e non qualificate (centri estetici, ambulatori etc), perchè si tratta comunque di un intervento chirurgico, nel quale le complicanze sono rare ma possono accadere ed essere facilmente risolte solo se l'intervento è eseguito da uno specialista in Chirurgia Plastica (www.sicpre.org) all'interno di strutture debita-

mente autorizzate.

Dove vengono fatte le incisioni?

Le vie di accesso maggiormente utilizzate nella chirurgia di aumento di volume di polpacci e glutei sono, rispettivamente, la piega poplitea, dietro il ginocchio, e la piega interglutea. Le incisioni sono minuscole in caso di lipofilling, e comunque sottilissime e nascoste nelle pieghe cutanee di polpacci o glutei, in caso di inserimento di protesi.

Che tipo di anestesia viene praticata, prof Gasparotti?

A seconda dei casi si può effettuare anestesia generale o locale con sedazione, in regime di day hospital o con una notte di ricovero in clinica. Dopo alcuni giorni di riposo a casa si possono riprendere le normali attività, ad eccezione di quelle sportive, per le quali bisogna aspettare un mese circa dopo l'intervento

